

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

ILE DE FRANCE

Bulletin Technique n°7 du 27 mai 2008 - 2 pages

Pomme de Terre

Mildiou

Les levées de pomme de terre sont très hétérogènes en fonction des secteurs et des dates de plantations, avec des levées qui s'échelonnent de 80% jusqu'à des plantes de 30 cm.

Situation au niveau du modèle GUNTZ-DIVOUX Station météo SRPV – Fredon – données au 26/05/2008				
Postes	Génération en cours	Date de la dernière contamination	Date prévisionnelle de sortie de taches	Pluies (en mm) depuis le 22 mai
77-Chevry Cossigny	4ème	25 et 26/05	01/06	7,5
77-Villeroy	4ème	25/05	01/06	0
78-Boissy Sans Avoir	4ème	25 et 26/05	01/06	27,5
78-Poissy	4ème	25/05	30/05	0.5
91-Abbeville la Rivière	5ème	24 au 26/05	31/05	14,5
95-Villiers le Sec	5ème	25/05	31/05	7,5
Situation au niveau du modèle GUNTZ-DIVOUX Station Météo France – données au 24/05/2008				
Postes	Génération en cours	Date de la dernière contamination	Date prévisionnelle de sortie de taches	Pluies (en mm) depuis le 22 mai
91-Bretigny	3ème	aucune		1,2
91-Courdimanche	2ème	aucune		2,8
91-Villiers le Bacle	3ème	aucune		5.8
78-Magnanville	2ème	aucune		15,2
95-Roissy	3ème	aucune		3,6
95-Cormeilles en Vexin	3ème	aucune		3,6
95-Wy dit Joli Village	3ème	aucune		7,6

Une grande partie des postes a atteint, la 4ème génération voire la 5ème pour Abbeville la Rivière (91) et Villiers le Sec (95).

Pour les variétés sensibles maintenez la protection fongicide en renouvelant l'application à 7 jours.

Les traitements des variétés « intermédiaires » doivent débuter à la fin de la semaine pour les secteurs de Chevry Cossigny, Villeroy, Poissy et Boissy sans Avoir si les parcelles sont levées à 50% avec un contact simple. Pour les secteurs d'Abbeville la Rivière et Villiers le Sec, renouvelez l'application à 7jours avec un contact simple.

Si vous observez dans l'environnement de votre parcelle du mildiou, soit sur repousses soit sur les tas de déchets, quelque soit la variété, intervenez avec un contact simple dès que 50% des plantes sont levées.

Pour les variétés « résistantes », le 1er traitement dans les secteurs d'Abbeville la Rivière et Villiers le Sec doit être réalisé avant la sortie de taches si les parcelles sont levées à 50% avec un contact simple.

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

Direction Régionale et Interdépartementale de l'Agriculture et de la Forêt
Service Régional de la Protection des Végétaux
ILE DE FRANCE
10 rue du séminaire
94516 RUNGIS cedex
Tél : 01-41-73-48-00
Fax : 01-41-73-48-48

Bulletin réalisé avec la participation de la FREDON Ile de France

Imprimé à la station D'Avertissements Agricoles de Rungis
Directeur gérant : N. THERRE

Irrigation et protection fongicide :

Sous irrigation, la croissance foliaire est favorisée par rapport à une culture sèche amenant un risque plus important du mildiou et ce dernier dépend également du mode d'arrosage utilisé.
Par canon, il y a lessivage des produits de contact mais peu d'action sur le développement du champignon comte tenu de la rapidité de l'apport en eau. Par contre, il convient de limiter le recoupement de canon et de surveiller particulièrement ces zones.

Par sprinkler en couverture totale, il y a lessivage des produits de contact. Compte tenu de la durée d'apport d'eau assez importante, ce type d'irrigation favorise la contamination du champignon.

Par micro irrigation, il n'y a pas lessivage du produit de contact.

L'irrigation contribue à allonger la période climatique à risque par l'humidité du sol qu'elle entretient sur la parcelle.

Il convient d'irriguer sur un feuillage protégé (en cas de risque) et d'attendre la mise en place des matières actives avant d'irriguer (se reporter à l'étiquette du bidon).

Ravageurs

Pucerons

Les pucerons ont été observés sur quelques parcelles, aucune intervention ne se justifie puisque le seuil de 50% de folioles porteuses de pucerons n'est pas encore atteint.

Lieu	% de folioles
77-Aufferville	3%
77-Chambry	10%
77-Iverny	0%
77-Jouy le Chatel	0%
77-Nangis	0%
77-Villenauxe la petite	5%
91-Milly la Forêt	25%

Doryphores

Aucun doryphore n'a été observé cette semaine en pârcelle mais les premiers adultes s'observent sur les repousses. A suivre.